

Họ và tên thí sinh:.....
Số báo danh:.....

- Câu 81.** *Huyết áp của một người là 120/70 biểu thị*
A. áp suất của động mạch/ áp suất của tĩnh mạch. B. áp suất ở tâm thất trái/ áp suất ở tâm thất phải.
C. áp suất của động mạch khi tim co/ áp suất của động mạch khi tim giãn
D. áp suất ở tâm thất trái/ áp suất ở tâm nhĩ trái.
- Câu 82.** *Theo quan niệm hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có vai trò quy định chiều hướng tiến hoá?*
A. Đột biến. B. Chọn lọc tự nhiên. C. Di - nhập gen. D. Các yếu tố ngẫu nhiên.
- Câu 83.** *Dạng đột biến điểm nào sau đây không làm tăng cũng không làm giảm số liên kết hidro của gen?*
A. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. B. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp X - G
C. Mất một cặp A - T. D. Thêm một cặp G - X.
- Câu 84.** *Đơn vị nhỏ nhất trong cấu trúc NST gồm đủ 2 thành phần ADN và protein histôn là*
A. pôlixôm. B. sợi cơ bản. C. nuclêôxôm. D. nuclêotit.
- Câu 85.** *Đơn phân cấu tạo nên prôtêin là*
A. axit amin. B. vitamin. C. nucleotit. D. glucose.
- Câu 86.** *Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể có ý nghĩa nào sau đây?*
A. Số lượng các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp
B. Đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường.
C. Đảm bảo nguồn thức ăn đầy đủ cho các cá thể trong đàn.
D. Sự phân bố các cá thể hợp lý hơn.
- Câu 87.** *Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn lá ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu. Trong chuỗi thức ăn này, cây ngô thuộc bậc dinh dưỡng*
A. cấp 3 B. cấp 1 C. cấp 2 D. cấp 4
- Câu 88.** *Thành phần axit amin trong chuỗi hemôglôbin của người và tinh tinh giống nhau. Điều này chứng tỏ người và tinh tinh có cùng nguồn gốc. Trong ví dụ này nhắc đến*
A. bằng chứng sinh học phân tử. B. bằng chứng phôi sinh học
C. bằng chứng giải phẫu so sánh D. bằng chứng địa lí sinh vật học
- Câu 89.** *Cơ thể có kiểu gen AABbDdEe giảm phân không xảy ra đột biến tạo ra các giao tử. Theo lí thuyết, giao tử có 4 alen trội chiếm tỉ lệ là*
A. 1/2 B. 1/16 C. 1/4 D. 1/8
- Câu 90.** *Vào mùa xuân và mùa hè thường có khí hậu ẩm áp, sâu hại thường xuất hiện nhiều. Đây là dạng biến động số lượng cá thể thuộc loại nào?*
A. Theo chu kỳ nhiều năm. B. Theo chu kỳ mùa. C. Không theo chu kỳ D. Theo chu kỳ ngày đêm.
- Câu 91.** *Trình tự nuclêôtit trong ADN có tác dụng bảo vệ và làm các NST không dính vào nhau nằm ở:*
A. Hai đầu mút NST. B. Điểm khởi sự nhân đôi C. Eo thứ cấp D. Tâm động
- Câu 92.** *Một loại thực vật có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 24$; một loại thực vật khác có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội $2n = 26$. Theo lí thuyết, giao tử tạo ra từ quá trình giảm phân bình thường ở thể song nhị bội được hình thành từ hai loài trên có số lượng nhiễm sắc thể là:*
A. 25 B. 27 C. 26 D. 24
- Câu 93.** *Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân đã sinh ra giao tử Ab với tỉ lệ 20%. Tần số hoán vị gen là bao nhiêu?*
A. 40%. B. 10%. C. 30%. D. 20%.
- Câu 94.** *Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Kiểu gen nào sau đây quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ?*
A. aaBb B. AaBb C. Aabb D. aaBB
- Câu 95.** *Ở cây, nước chủ yếu được thoát qua cơ quan nào sau đây?*
A. Thân B. Lá C. Hoa D. Rễ
- Câu 96.** *Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, kết quả của giai đoạn tiến hóa hóa học là hình thành nên*
A. Các sinh vật đa bào. B. Các đại phân tử hữu cơ phức tạp
C. Các sinh vật đơn bào nhân thực D. Các tế bào sơ khai
- Câu 97.** *Trong quần thể, thường không có kiểu phân bố nào sau đây?*
A. Phân tầng. B. Phân bố theo nhóm. C. Phân bố ngẫu nhiên. D. Phân bố đồng đều.
- Câu 98.** *Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa như thế nào?*
A. Chi tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hóa ngoại bào và tiêu hóa nội cùng lúc.

C. Chủ yếu là tiêu hóa ngoại bào. D. Chủ yếu là tiêu hóa nội bào.

Câu 99. Trong những thành tựu sau đây, thành tựu nào là của công nghệ tế bào ?

- A. tạo ra giống lúa có khả năng tổng hợp carotenoid. B. tạo ra giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.
C. tạo ra giống vi khuẩn *E. coli* có khả năng sản xuất insulin của người.
D. Tạo ra cừu Dolly.

Câu 100. Một số loài cây sống gần nhau có hiện tượng rễ của chúng nối lại với nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây?

- A. hợp tác. B. cộng sinh. C. cạnh tranh. D. hỗ trợ cùng loài

Câu 101. Dựa theo kích thước quần thể, trong những loài dưới đây, loài nào có kiểu tăng trưởng số lượng gần với hàm số mũ?

- A. Ba ba ven sông. B. Vi khuẩn lam trong hồ. C. Rái cá trong hồ D.Ếch nhái ven hồ.

Câu 102. Xét một gen có 2 alen là A và a. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A = 0,6 thì kiểu gen AA chiếm tỉ lệ

- A. 0,16 B. 0,25. C. 0,36 D. 0,48.

Câu 103. Khi nói về hô hấp ở động vật, trong số các phát biểu sau đây

- I. Tốc độ khuếch tán khí qua bề mặt trao đổi khí tỉ lệ thuận với độ dày của bề mặt trao đổi.
II. Ở côn trùng, khí oxy từ ống khí được vận chuyển nhờ các phân tử hemoglobin trong máu.
III. Hiệu suất quá trình trao đổi khí ở lưỡng cư, bò sát, thú thấp hơn so với ở chim.
IV. Ở người, chưa đến 50% lượng khí oxy đi vào phế nang được hấp thu vào máu.

Số phát biểu chính xác là:

- A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 104. Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Có bao nhiêu kiểu gen quy định kiểu hình cây thân cao?

- A. 2 B. 4 C. 3 D. 1

Câu 105. Trong kĩ thuật chuyển gen, plasmit là?

- A. Enzym nối. B. Tế bào nhận. C. Tế bào cho D. Thể truyền

Câu 106. Mỗi phân tử ADN được cấu tạo từ bao nhiêu chuỗi polynucleotit?

- A. 3 chuỗi. B. 4 chuỗi. C. 2 chuỗi D. 1 chuỗi.

Câu 107. Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vườn ngập mặn Cần Giờ đã được khôi phục lại và được công nhận là khu dự trữ Sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của hiện tượng

- A. Diễn thế khôi phục B. Diễn thế thứ sinh
C. Diễn thế nguyên sinh D. Diễn thế nguyên sinh hoặc diễn thế khôi phục

Câu 108. Ở người, gen nằm ở vị trí nào sau đây sẽ di truyền theo dòng mẹ ?

- A. Trong ty thể B. Trên NST giới tính X. C. Trên NST thường D. Trên NST giới tính Y.

Câu 109. Sinh vật nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen diễn ra chủ yếu ở giai đoạn

- A. dịch mã. B. trước phiên mã. C. phiên mã. D. sau dịch mã.

Câu 110. Theo thuyết tiến hóa hiện đại, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu sơ cấp của quá trình tiến hóa?

- A. Đột biến nhiễm sắc thể B. Đột biến gen C. Thường biến D. Biến dị tổ hợp.

Câu 111. Các đột biến A, B, C, D, E, F, được nằm trong vùng mất đoạn, nhưng trình tự của các đột biến trên NST chưa được biết. Các con ruồi đồng hợp tử về các kiểu hình mất đoạn được nhận biết qua kết quả ở bảng sau:

Mất đoạn Dạng	Đột biến					
	A	B	C	D	E	F
1	m	+	+	m	+	m
2	+	+	+	m	+	m
3	+	m	+	m	+	+
4	+	m	m	+	m	+
5	+	m	m	m	+	+
6	+	m	m	m	m	+

Cho biết kí hiệu "m" là kiểu hình bình thường (kiểu dại); "+" là kiểu hình đột biến. Có bao nhiêu phát biểu đúng?

- I. Đột biến mất đoạn A là ngắn nhất. II. Đột biến mất đoạn D là ngắn nhất.
III. Đột biến mất đoạn B là ngắn hơn so với đoạn E. IV. Đột biến mất đoạn C là dài hơn so với đoạn F.

- A. 3 B. 2 C. 4 D. 1


Câu 112. Hình dưới đây mô tả về ảnh hưởng qua lại giữa các loài trong một quần xã.

Có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

- (1) D3 và D4 thuộc mối quan hệ hợp tác.

- (1) Canh tác nông nghiệp làm giảm chất thải CO₂ khí quyển.
- (2) Lượng O₂ trong đất thấp là nguyên nhân khiến cho hàm lượng CO₂ phát thải ở mẫu W thấp.
- (3) Hệ sinh vật phân giải ở đồng rêu hoạt động mạnh hơn ở đất nông nghiệp.
- (4) Đồng rêu là khu vực có nhiệt độ thấp, độ ẩm cao và oxi hòa tan rất thấp.


A. 2 B. 3 C. 4 D. 1



Câu 118. Các nhà khoa học thực hiện nghiên cứu về sự ảnh hưởng của ấu trùng cánh lông (*Helicopsyche borealis*) thường dùng tảo làm thức ăn. Ấu trùng sống ở suối Bắc Mỹ, thường xây dựng tổ di động từ các hạt cát. Chúng ăn tảo và vi khuẩn trên đá, đòi hỏi chúng phải thường xuyên di chuyển nơi ở để tránh khỏi các mối đe dọa. Các nhà khoa học đã thực hiện khảo sát về ảnh hưởng của *H. borealis* tới nguồn thức ăn của nó trong môi trường sinh sống. Các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm bằng cách đặt các tấm gạch dưới đáy của dòng suối và theo dõi sự xâm chiếm của tảo và *H. borealis* trên các bề mặt nhân tạo này trong khoảng 7 tuần. Dựa vào kết quả nghiên cứu có bao nhiêu kết quả sau đây đúng?

- (1) Sinh khối tảo tăng nhanh trong 2 tuần đầu tiên của thí nghiệm và suy giảm khi ấu trùng *H. borealis* xâm chiếm các bề mặt nhân tạo ở 3 tuần tiếp theo.
- (2) Ấu trùng làm giảm độ phong phú về nguồn thức ăn đối với các loài sử dụng tảo làm thức ăn của quần xã này.
- (3) Mọi quan hệ giữa ấu trùng cánh lông và tảo giống mọi quan hệ giữa tảo giáp và cá nhỏ ở cùng vùng biển.
- (4) Ở 2 tuần cuối số lượng loài *H. borealis* suy giảm cho thấy nguồn dinh dưỡng cạn kiệt, tạo điều kiện cho sinh khối của tảo tăng nhanh.

A. 3 B. 2 C. 4 D. 1



Câu 119. Ở một loài động vật, khi cho con đực (XY) lông đen, cánh dài lai phân tích, đời con có 50% con đực lông trắng, cánh ngắn; 25% con cái lông trắng, cánh dài; 25% con cái lông đen, cánh dài. Cho biết tính trạng chiều cao chân do một cặp gen quy định và không xảy ra đột biến. Cho con đực đời P giao phối với con cái lông đen, cánh dài của F_a, thu được đời F₁ có 13,125% con đực lông đen, cánh dài. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây không đúng?

- (1) Kiểu gen của con cái lông đen, cánh dài F_a là AaX^{BD}X^{BD}
- (2) Hoán vị gen đã xảy ra ở cả hai giới với tần số 30%.
- (3) Ở F₁ có 50,625% con cái lông đen, cánh dài.
- (4) Tỷ lệ con đực lông trắng, cánh ngắn ở đời F₁ chiếm tỷ lệ là 15%.

A.1 B. 2 C. 3 D. 4

Câu 120. Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

Thành phần kiểu gen	Thế hệ P	Thế hệ F ₁	Thế hệ F ₂	Thế hệ F ₃	Thế hệ F ₄
AA	7/10	16/25	3/10	1/4	4/9
Aa	2/10	8/25	4/10	2/4	4/9
aa	1/10	1/25	3/10	1/4	1/9

Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chỉ do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

- I. Quần thể này là quần thể tự thụ phấn.
 - II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F₂ có thể do di - nhập gen.
 - III. Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F₃ không còn khả năng sinh sản.
 - IV. Nếu F₄ vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F₃ thì tần số kiểu hình lặn ở F₅ là 9/16.
- Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

----- HẾT -----