

Họ, tên thí sinh:

Số báo danh:

Mã đề: 0737

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Loại máy nào sau đây được sử dụng trong chăm sóc cây trồng?

- A. Máy gieo hạt. B. Máy phun thuốc trừ sâu.
C. Máy thu hoạch. D. Máy cấy.

Câu 2: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Thu dọn tàn dư cây rừng sau khai thác gỗ.
(b) Đốt củi trong rừng lấy than.
(c) Lắp đặt biển báo ở nơi có nguy cơ cháy rừng cao.
(d) Đốt rừng làm nương rẫy.

Số phát biểu đúng về phòng chống cháy rừng là

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 3: Biện pháp nào sau đây **không** sử dụng để bảo vệ môi trường trong chăn nuôi?

- A. Sử dụng đệm lót sinh học trong chuồng nuôi.
B. Thường xuyên khơi thông cống, rãnh thoát nước thải đã xử lí.
C. Sử dụng nước thải chăn nuôi chưa xử lí để vệ sinh chuồng nuôi.
D. Tiêu độc, khử trùng chuồng nuôi đúng quy định.

Câu 4: Yêu cầu nào sau đây **không** phù hợp với chuồng nuôi lợn thịt quy mô công nghiệp?

- A. Xây dựng hệ thống xử lí chất thải chăn nuôi.
B. Nền chuồng cao hơn mặt đất để tránh ẩm ướt.
C. Nền chuồng có độ dốc vừa phải để khô ráo.
D. Xây dựng chuồng nuôi gần khu dân cư.

Câu 5: Mô hình chăn nuôi công nghệ cao nào sau đây theo dõi được tình trạng sức khỏe vật nuôi?

- A. Mô hình nuôi lợn gắn chip. B. Mô hình nuôi bò chăn thả tự do.
C. Mô hình nuôi gà thả vườn. D. Mô hình nuôi vịt chăn thả tự do.

Câu 6: Công nghệ nào sau đây **không** phải là công nghệ cao trong chế biến sản phẩm chăn nuôi?

- A. Chế biến xúc xích công nghiệp. B. Chế biến sữa chua thủ công.
C. Chế biến thịt hộp. D. Chế biến sữa bột.

Câu 7: Quá trình nuôi tôm trong bể nổi, vào những ngày nắng nóng, nhiệt độ nước bể nuôi tăng cao ảnh hưởng đến hoạt động sống của tôm. Biện pháp nào sau đây làm giảm nhiệt độ nước trong bể nuôi?

- A. Bỏ sung nước vôi trong vào bể nuôi.
B. Cho tôm ăn thức ăn có hàm lượng protein cao.
C. Sử dụng lưới che nắng cho bể nuôi.
D. Bỏ sung chế phẩm vi sinh vào bể nuôi.

Câu 8: Loại thức ăn thủy sản nào sau đây có hàm lượng protein cao nhất?

- A. Cỏ tươi. B. Cám gạo. C. Bột thịt. D. Bột ngô.

Câu 9: Trong phát triển rừng, trồng mới rừng có vai trò nào sau đây?

- A. Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc. B. Tăng xói mòn đất rừng.
C. Tăng sạt lở đất rừng. D. Giúp cỏ dại phát triển mạnh.

Câu 10: Cho các phát biểu sau đây:

- (a) Sử dụng vi khuẩn kỵ khí để phân giải chất hữu cơ trong chất thải.
(b) Có khả năng tiêu diệt hầu hết các mầm bệnh trong chất thải.
(c) Tạo ra phân bón cho cây trồng.
(d) Tạo ra chất khí làm nhiên liệu đun nấu.

Số phát biểu đúng về xử lí chất thải chăn nuôi bằng phương pháp ủ phân nóng (ủ phân compost) là

- A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

- Câu 11:** Khi quan sát rừng keo lá tràm nhận thấy cây ngừng sinh trưởng, tán lá thưa thớt và xuất hiện nhiều cành khô. Các biểu hiện này thuộc giai đoạn nào sau đây trong đời sống của cây keo lá tràm?
- A. Giai đoạn cây non. B. Giai đoạn gần thành thực.
C. Giai đoạn già cỗi. D. Giai đoạn thành thực.
- Câu 12:** Phương pháp bảo quản thủy sản nào sau đây **không** được phép sử dụng trên các tàu đánh bắt thủy sản xa bờ?
- A. Ướp muối. B. Làm lạnh. C. Ướp đạm (Urea). D. Lạnh đông.
- Câu 13:** Tôm càng xanh sinh trưởng ở vùng nước ngọt, khi sinh sản tôm có tập tính di cư đến
- A. thượng nguồn nơi nước có độ pH thích hợp.
B. thượng nguồn nơi nước có độ trong cao.
C. vùng đầm lầy nước ngọt có độ trong thích hợp.
D. cửa sông nơi nước có độ mặn thích hợp.
- Câu 14:** Bệnh đốm trắng là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên tôm do Baculovirus gây ra, gây thiệt hại lớn cho người nuôi. Khi bệnh xuất hiện, biện pháp nào sau đây giúp ngăn chặn bệnh lây lan giữa các ao nuôi tôm?
- A. Sử dụng thuốc kháng sinh thích hợp để trị bệnh đốm trắng cho tôm.
B. Tăng cường lượng lớn thức ăn cho tôm.
C. Tháo nước ao nuôi tôm bị bệnh ra môi trường khi chưa xử lí.
D. Khử trùng nước ao nuôi, cách li ao nuôi có tôm bệnh với ao khác.
- Câu 15:** Trong ao nuôi cá chép, vào những ngày thời tiết âm u, tiến hành kiểm tra nước ao nuôi thấy hàm lượng oxygen hòa tan thấp ảnh hưởng đến sinh trưởng của cá. Để xử lý hiện tượng này, biện pháp nào sau đây phù hợp?
- A. Tăng lượng thức ăn cho cá.
B. Tăng cường sử dụng quạt nước trong ao nuôi.
C. Bổ sung phân hữu cơ vào ao nuôi.
D. Bổ sung vitamin vào thức ăn cho cá.
- Câu 16:** Cám gạo thuộc nhóm thức ăn thủy sản nào sau đây?
- A. Thức ăn (chất) bổ sung. B. Thức ăn tươi sống.
C. Nguyên liệu thức ăn. D. Thức ăn hỗn hợp.
- Câu 17:** Cho các phát biểu sau đây:
- (a) Định kì khử trùng chuồng nuôi.
(b) Thu gom và xử lí chất thải đúng quy định.
(c) Phun thuốc hóa học quá nồng độ để vệ sinh chuồng nuôi.
(d) Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi sạch sẽ.
- Số phát biểu đúng về biện pháp vệ sinh chuồng nuôi là
- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.
- Câu 18:** Cho các phát biểu sau đây:
- (a) Trồng cây công nghiệp trên đất rừng tự nhiên.
(b) Đẩy mạnh trồng mới rừng và phục hồi rừng nghèo.
(c) Mở rộng diện tích đất nông nghiệp trên đất rừng đặc dụng.
(d) Xây dựng các khu du lịch trong rừng phòng hộ đầu nguồn.
- Số phát biểu đúng về nguyên nhân suy thoái tài nguyên rừng là
- A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
- Câu 19:** Phân bón vi sinh có đặc điểm chính nào sau đây?
- A. Gây hại cho đất khi sử dụng liên tục.
B. Gây ô nhiễm cho môi trường.
C. Có hàm lượng dinh dưỡng cao.
D. Chứa vi sinh vật sống có ích.

Câu 20: Trong các hoạt động cơ bản của lâm nghiệp, hoạt động nào sau đây thuộc bảo vệ rừng?

- A. Phòng chống cháy rừng. B. Tia cảnh cây rừng.
C. Tia thưa cây rừng. D. Trồng dặm cây rừng.

Câu 21: Cây trồng nào sau đây được trồng trong hệ thống khí canh?

- A. Cây cà phê. B. Cây xà lách. C. Cây cam. D. Cây bưởi.

Câu 22: Trong các phương thức khai thác rừng, khai thác chọn là

- A. chặt toàn bộ cây rừng đã thành thực trong nhiều lần (mùa) khai thác.
B. chọn chặt từng cây rừng đã thành thực, giữ lại cây còn non.
C. chọn chặt các cây rừng bị sâu bệnh, giữ lại cây thành thực.
D. chặt toàn bộ cây rừng đã thành thực trong một lần (mùa) khai thác.

Câu 23: Trong chăn nuôi, kiểu chuồng kín có nhược điểm nào sau đây?

- A. Chi phí đầu tư ban đầu lớn.
B. Khó kiểm soát nhiệt độ trong chuồng nuôi.
C. Không phù hợp với chăn nuôi công nghiệp.
D. Khó kiểm soát dịch bệnh.

Câu 24: Đối với đời sống con người và kinh tế - xã hội, ngành chăn nuôi **không** có vai trò nào sau đây?

- A. Cung cấp lương thực cho con người.
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến.
C. Cung cấp phân bón hữu cơ cho trồng trọt.
D. Cung cấp sức kéo cho sản xuất nông nghiệp.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Hiện nay, mô hình nuôi cá rô phi trong lồng trên sông theo quy hoạch được nhiều địa phương trong cả nước khuyến khích mở rộng. Bố trí các lồng nuôi thành từng cụm để thuận lợi cho việc chăm sóc và bảo vệ. Tuy nhiên, với mô hình này các hộ nuôi thường khó kiểm soát được dịch bệnh nên rất dễ phát tán nguồn bệnh khi mầm bệnh xuất hiện.

a) Khi dịch bệnh xảy ra, người nuôi sử dụng thuốc kháng sinh phun lên mặt nước lồng nuôi để trị bệnh cho cá.

b) Nuôi cá rô phi trong lồng trên sông theo quy hoạch nhằm tận dụng các điều kiện tự nhiên góp phần cung cấp sản phẩm thủy sản cho tiêu dùng.

c) Tận dụng dòng chảy của sông để cung cấp oxygen hòa tan cho cá.

d) Các cụm lồng nuôi được xếp với mật độ hợp lý để tạo độ thông thoáng và hạn chế tồn đọng chất thải gây ô nhiễm môi trường nước.

Câu 2: Khai thác thủy sản tạo sinh kế cho người dân. Trong quá trình khai thác, ngư dân thường sử dụng các loại ngư cụ như lưới kéo, lưới rê, lưới vây, câu. Sản lượng thủy sản biển và nội địa được khai thác trong giai đoạn từ 2019 đến 2021 thể hiện ở bảng dưới đây:

Đơn vị: Nghìn tấn

| Năm | Khai thác biển | Khai thác nội địa |
|------|----------------|-------------------|
| 2019 | 3633,1 | 196,2 |
| 2020 | 3700,3 | 196,2 |
| 2021 | 3745,1 | 195,0 |

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

a) Trong khai thác biển, ngư dân cần tuân thủ các quy định về quản lý vùng và ngư cụ góp phần bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản bền vững.

b) Để tăng tổng sản lượng thủy sản theo hướng bền vững, cần tập trung nhân lực và các loại ngư cụ khai thác thủy sản vào mùa sinh sản của chúng.

c) Tổng sản lượng thủy sản biển được khai thác năm 2021 cao hơn năm 2020 là 44,8 nghìn tấn góp phần cung cấp nguồn thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng và xuất khẩu.

d) Trong giai đoạn từ 2019 đến 2021, sản lượng thủy sản nội địa được khai thác cao nhất vào năm 2021.

Câu 3: Cá song là một trong những loài thủy sản nước mặn có giá trị kinh tế cao, có thể nuôi trong ao đất. Trong quá trình nuôi, cá song dễ bị bệnh hoại tử thần kinh do Betanodavirus gây ra. Người ta có thể sử dụng kỹ thuật PCR để phát hiện mầm bệnh hoại tử thần kinh trên cá song. Betanodavirus kí sinh trong tế bào thần kinh và võng mạc của cá. Virus phát triển mạnh khi nhiệt độ môi trường khoảng 25-30 °C. Khi bị bệnh, cá có triệu chứng bỏ ăn, bơi không định hướng, xoay tròn. Bệnh lưu hành rộng, tốc độ lây lan nhanh, tỉ lệ chết từ 70% đến 100% ở kích cỡ cá khoảng 2-4 cm (giai đoạn cá hương).

- a) Tác nhân gây bệnh hoại tử thần kinh trên cá song là Betanodavirus.
- b) Nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng đến sự phát triển bệnh hoại tử thần kinh trên cá song.
- c) Sử dụng kỹ thuật PCR phát hiện sớm và chính xác bệnh hoại tử thần kinh trên cá song để kịp thời xử lý, giảm thiểu thiệt hại kinh tế cho người nuôi.
- d) Khi cá song bị bệnh hoại tử thần kinh, cần tăng cường lượng thức ăn cho cá để tăng sức đề kháng.

Câu 4: Bảng dưới đây thể hiện diện tích rừng trồng mới ở nước ta trong giai đoạn từ 2017 đến 2020.

Đơn vị: Nghìn ha

| Năm | Tổng số | Rừng sản xuất | Rừng phòng hộ | Rừng đặc dụng |
|------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 2017 | 284,9 | 267,7 | 15,1 | 2,1 |
| 2018 | 282,4 | 268,0 | 12,5 | 1,9 |
| 2019 | 268,4 | 255,9 | 11,1 | 1,4 |
| 2020 | 269,9 | 260,3 | 7,8 | 1,8 |

Nguồn: Niên giám thống kê năm 2023, Nxb Thống kê.

- a) Diện tích rừng sản xuất trồng mới năm 2018 lớn hơn năm 2017 là 0,3 nghìn ha góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân.
- b) Ở những khu vực đất có độ dốc cao, để tăng sản lượng gỗ nên khai thác rừng đặc dụng bằng phương thức khai thác trắng.
- c) Năm 2019, so với tổng diện tích rừng trồng mới, tỉ lệ diện tích rừng phòng hộ trồng mới thấp hơn tỉ lệ diện tích rừng sản xuất trồng mới là 88,7%.
- d) Trong giai đoạn từ 2017 đến 2020, tổng diện tích rừng trồng mới năm 2017 là lớn nhất.

----- **HẾT** -----

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.